

## ATRATIVO ALIMENTAR PARA AS MOSCAS-DAS-FRUTAS

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

ANAMED WB é um atrativo alimentar para as moscas-das-frutas, indicado como adjuvante potencializador em mistura com inseticida.

### INDICAÇÕES DE USO

Uso indicado como atrativo para moscas-das-frutas, família Tephritidae, especialmente para *Anastrepha spp*, *Bractocera spp* e *Ceratitis capitata*. Usar em culturas agrícolas onde são detectadas moscas-das-frutas. Atente à vegetação circundante que pode servir como local de refúgio para os insetos. Use como adjuvante potencializador em misturas com inseticidas.

### VANTAGENS

ANAMED WB não atrai abelhas e inimigos naturais, e diminui o consumo de água quando comparado a aplicações de inseticidas tradicionais.

### INSTRUÇÕES DE USO

**ÉPOCA:** Aplicar a mistura de ANAMED WB mais inseticida e água na primeira detecção das moscas-das-frutas na cultura em armadilhas de monitoramento. **PREPARO DA MISTURA:** Misture 1 parte de ANAMED com 1 parte de água limpa. Aumente a quantidade de água para climas secos: misture 1 parte de ANAMED com 2 partes de água limpa. Adicione um inseticida aprovado para o inseto-alvo e para a cultura agrícola. Misture bem. Após esvaziar a embalagem de ANAMED WB, coloque uma pequena quantidade de água no seu interior para soltar as sobras de produto fixados nas paredes e adicione ao pulverizador junto ao restante da mistura.

**EQUIPAMENTOS:** Use pulverizadores manuais ou mecânicos para garantir a aplicação da mistura ANAMED WB mais inseticida e água no local correto, na quantidade e tamanho de gota desejada. Após o uso do equipamento de aplicação, lave-o com água morna e detergente neutro. **APLICAÇÃO:** Direcione o jato do pulverizador para o caule da árvore ou para o centro da folhagem. Evite aplicar diretamente sobre as frutas. Aplique gotas de 4 mm de diâmetro ou mais para otimizar a vida útil do produto. **CUIDADOS GERAIS:** Consulte um técnico habilitado para determinar a época e dose correta de aplicação. Para melhores resultados, remova as frutas caídas na área. **ADVERTÊNCIAS:** A descoloração localizada pode ocorrer quando a mistura de ANAMED WB mais inseticida é aplicada diretamente em frutas ou folhas. Isso não danificará a planta. ANAMED WB não controla larvas. Utilize a mistura ANAMED WB mais inseticida e água dentro de 24 horas depois de misturado. Evite a aplicação nas horas mais quentes do dia. **RESTRIÇÕES DE USO:** Não aplicar se houver previsão de chuvas dentro de 8 horas. Não aplique em superfícies molhadas.

### VOLUME RECOMENDADO

Aplique, por hectare, de 2 a 3 litros da mistura de ANAMED mais inseticida e água.

**ATENÇÃO:** ESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSA A LEITURA ATENTA DO RÓTULO.



MOSCA-DA-FRUTA *CERATITIS CAPITATA*



APLICAÇÃO DE ANAMED WB NA CULTURA DA MANGA

### COMPOSIÇÃO

- Proteínas, açúcares ..... 48%
- Inertes: diluentes, conservantes, espessantes ..... 52%

### APARÊNCIA

Líquido marrom

### ARMAZENAMENTO

Armazene o produto lacrado na embalagem original em local fresco e seco, longe da luz solar direta. Para uma vida útil ideal, não exceda 25°C. Não congele.

### EMBALAGEM

Recipientes de 1L, 5L e 20L.